

giões tendo tratado de casos muitos mais simples que, ha alguns annos, teriam sido enviados a Spencer Wells.

Lord Selborne, n'um discurso publico, demonstrou uma vez como a cura de 373 operadas dos quinhentos primeiros casos de Wells representavam um ganho total de 10.817 annos de vida humana. Pelo mesmo calculo, multiplicando as 768 curas por 29, o numero de seguro « *life expectancy* », achamos que 22.272 annos de vida humana pôdem ser avaliados como tendo sido addicionados á sociedade pelo trab alho directo de Spencer Wells. A este respeito e sobre as observações que fizemos todo o commentario é inutil. Sem esquecer quer o introductor quer os aperfe içoadores actuaes da ovariectomia, Spencer Wells libertou a operação do descredito em que tinha caído e estabeleceu-a, na opinião de toda a profissão, aqui e fóra, como uma operação cirurgica legitima e maravilhosamente util. (*The Brit. med. journal.*)

FRACTURA DO FEMUR N'UM ADULTO POR ACÇÃO MUSCULAR SUBITA — O Sr. Clarence Foster communicou ao *London Med. Times and Gazette* o seguinte caso, de que o auctor pediu a transcripção:

« Fui chamado, na tarde de 16 de junho, para visitar um homem de cincoenta annos d'idade, que encontrei soffrendo de uma fractura transversal simples do femur esquerdo, no terço medio.

Como é ordinario n'este accidente, havia consideravel deformidade, tornando immediatamente visivel a natureza exacta da lesão. Interrogando o doente, soube d'elle que não tinha caído nem de qualquer modo soffrera violencia directa sobre o membro, mas que

andando pela casa tropeçára de leve e tentando manter o equilibrio, a subita acção muscular assim determinada causára a ruptura do osso.

A historia d'este caso, se não é sem igual, é pelo menos notavel, porque embora Debeaumarchef, Curet e Leveillé tenham citado alguns exemplos analogos, uma auctoridade eminente, Richerand, assevera positivamente que um osso comprido, quando em estado de saude, nunca póde quebrar só por esse meio; e eu não tenho razão de suppor a existencia de qualquer estado anormal no meu doente. »

SOBRE A APPLICAÇÃO DA ELECTROLIZE NA OPHTALMOTERAPIA.— Para o tratamento de tumores — carcinomas e angiomas, cuja eliminação por outros meios seria incerta e perigosa, recommenda o Dr. Nieden a cauterisação electrolitica, cujo effeito deve ser determinado conforme a força da corrente electrica do numero dos elementos, das agulhas de punção e da duração da sua applicação. Ordinariamente applicam-se 4 a 5 elementos (pilha de corrente constante de Spamer). Foi introduzida primeiramente a agulha positiva (de ouro), depois a negativa; e mais do que uma d'estas, em grandes tumores. Estabeleceu-se a corrente. Depois de trabalhar 1 — 1 ½ minutos, durante o qual tempo viram-se bolhas de gaz desenvolvendo-se em roda da agulha negativa, tirou-se esta para punccionar com ella um sitio mais distante no tumor. Este processo repetia-se mais vezes na mesma secção, conforme a dôr, o effeito e a reacção. Ligadura antiseptica e fomentações com agua fria. As secções fizeram-se de dois em dois dias, ou de tres em tres. Ordinariamente applicou-se a electrolisis.