

rém que as partes da uvea, situadas adeante da ora serrata, ficam inflammadas, mostra-se a complicação. — A doença do aparelho regulador do abastecimento sanguineo do globo ocular nas irites e cyclites não é um acaso; explica-se pelo facto de estar este aparelho situado dentro do corpo ciliar, ou contiguo a elle. — A hypotonia é excepção muito rara na irite e cyclite. Talvez é ella uma doença que raramente acompanha estes casos de irite e cyclite, nos quaes a pupilla fica mais dilatada do que no olho normal.

TRATAMENTO DO KERATACÓNE COM A ESERINA — Um doente com keratacône em ambos os olhos havia sido pelo Dr. Steinheim operado do olho esquerdo e tratado com bom resultado conforme o methodo de von Graefe.

No outro olho o mesmo doutor applicou eserina, com ligadura compressiva, quando a turvação do cône havia já augmentado e o cume d'este amollecido e quasi formando bolha proeminente. Os circulos de diffusão foram diminuindo gradualmente, e a determinação da chamma de uma vela tornou-se cada vez mais distincta.

Depois de usar da eserina durante seis semanas (uma vez por dia) lia o doente Jaeg. n. 3 a 4 pollegadas; e, passados seis mezes, Snell. n. 1 1/2 a 3 pollegadas.