

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

CIRURGIA

NEPHRO-LITHOTOMIA — Em uma sessão da *Clinical Society* de Londres o Dr. Morris leu as notas de um caso em que esta operação foi com bom exito praticada. Pelo termo — Nephro-lithotomia — elle designou a remoção, atravez de uma incisão lombar, de um calculo do rim, sem que houvesse dilatação da bexiga, e achando-se o orgão, não obstante a presença do calculo, presumivelmente são. Quiz assim distinguir dos numerosos casos em que o rim tem sido cortado para evacuação do liquido nelle accumulado, como o resultado de um calculo renal, de uma affecção tuberculosa, ou de outra qualquer causa, aos quaes de longa data tem-se applicado o nome de — nephrotomia; assim como dos casos tambem numerosos, em que o calculo tem sido removido depois de descoberto atravez de alguma fistula, em um dos lombos.

Uma rapariga, criada, de 19 annos de idade, soffreu durante 8 annos de diversos accessos de hematuria, acompanhada de dor no rim direito; foi diversas vezes admittida ao *Middlessex Hospital*, onde pelo repouso e tratamento os *symptomas* diminuiram; em Fevereiro de 1880, porem, aconselharam-n'a a que se submettesse a uma incisão exploratoria, posto que não houvesse inchação, havendo entretanto intensa nephralgia. Depois de chloroformisada a doente, foi o rim descoberto atravez de uma incisão lombar obliqua. Percebia-se uma substancia dura proxima do hilo, no qual uma incisão foi feita, tocado um calculo e extrahido pela ponta do dedo. Não houve hemorrhagia, a doente restabeleceu-se rapidamente, restando apenas uma pequena

cavidade que excretava cerca de quatro grammas de pus diariamente. (*Medical Times and Gazette*, Novembro, 1880.)

CYSTOTOMIA PARA EXTIRPAÇÃO DE UM NEOPLASMA — O Professor Marcacci (*Lo Sperimentale* — Outubro de 1880) refere um caso em que foi praticada esta operação.

O doente era um homem de 54 annos, cujos precedentes de familia tinham sido sempre bons. O primeiro symptoma que attrahiu-lhe a attenção foi a hematuria, experimentando elle mais tarde grande dor e difficuldade na micção. O diagnostico do caso foi por algum tempo obscuro, até que em uma occasião uma pequena porção de substancia que com a urina atravessava a urethra revelou a presença de cellulas neoplasticas. A operação da cystotomia foi decidida e realisada por meio de uma incisão de 13 centimetros, a começar um centimetro acima do bordo superior da symphise pubiana, extendendo-se pela linha alva. A bexiga foi achada enormemente distendida, todo o seu interior cheio de uma grande massa villosa e neoplastica. Removido o neoplasma, a observação microscopica demonstrou que se tratava de um tumor fuso-cellular, de forma alveolar. Os bordos da incisão da bexiga foram unidos por quatro pontos de catgut, a ferida abdominal por uma sutura metallica, e o todo tratado anti septicamente. O doente passou bem durante os dez primeiros dias apoz a operação; quando, porem, foram tiradas as suturas metallicas, a ferida aparentemente cicatrisada deixou escapar das aberturas deixadas pelos fios, gottas de urina. Foram em vão todas as tentativas para curar esta fistula urinaria e o doente morreu dous mezes depois da operação. A necropsia mostrou uma abertura